

A. 43 *Prunus avium*, Cirerer de Cal Rubí

FITXA DE CAMP

Diàmetre major de la copa: 13 m

Diàmetre menor: 9 m

Alçada aproximada: 8,5 m

Ramificació: Molt oberta i gran, branques molt caigudes.

Estat de gestió: Abandonat esporgat en un passat?

Estat sanitari aparent i/o evidències de patologies: Molt vell, branques mortes escorça mal ferida (plaga o malaltia?)

Amenaces: No presenta

Orientació, situació a prop de cursos fluvials: Força ombrívol, molt recollit pels seus fills, rep més insolació per les bandes est i oest.

Tipus de sòl: Ric

Rebrots a la base, peus joves al voltant: Sí molt

Ubicació i accessibilitat (finca privada, accés fàcil o no, propietari): Accés fàcil a peu deixant el cotxe al pàrquing de Masia Marimon. Es troba en una masia abandonada; Cal Rubí al terme de Llacuna.

Fenologia en moment de visita: Desenvolupament fulles , ja ha passat la floració.

CARACTERITZACIÓ

Fenologia: Abril: Desenvolupament total de les fulles

Característiques fruits:

Característiques organolèptiques

Conservació fruits: [...] En otros estudios, se indica que hormonas como el ácido jasmónico, el ácido salicílico y la melatonina también estarían implicadas en estos procesos, además de ser componentes en tratamientos para la conservación de frutos durante su poscosecha Font: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/147757/1/VTE_TESIS.pdf

És un fruit no climacteric, el que suposa que té una vida curta després de la seva recol·lecció. Des del punt de vista del consumidor, conservar en

fred és una bona manera de conservació ja que comporta una disminució del seu metabolisme i un endarreriment en el seu deteriorament. A 4 ° C la concentració d' ABA augmenta, evitant pèrdues d'aigua i allargant la seva vida útil.

Productivitat: regular o alternada en anys amb molta producció

Tipus de multiplicació: Empelt

Tipus d'empelt:

Sobre quin peu es fan els empelts: *Prunus domestica*, Prunera; *Prunus cerasifera*, Mirabolà; Patró Monrepós, selecciona pel Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (Font: [https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=FMG04-SFTT-23%20V3_20CLO1_1%20Cerezo.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=171486&IDTIPO=60&RASTRO=c215\\$m58249.59805.67760](https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=FMG04-SFTT-23%20V3_20CLO1_1%20Cerezo.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=171486&IDTIPO=60&RASTRO=c215$m58249.59805.67760))

Gestió arbre: Abandonat

Possibles plagues: *Ceratitis capitata*, *Caliroacerasi* L., Antracnosis, Cilindrosporosis (*Blumeriella jaapii*), Cribado (*Stigmina carpophila*), Gnomonia (*Apiognomonía erythrostoma*), Monilia (*Monilia laxa*, *M. fructigena*) Chancro bacteriano (*Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum*), Pulgón (*Myzus cerasi*), Caliroa (*Caliroa limacina*) Mal del plomo (*Chondrostereum purpureum*). Font: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/rgf_comite_co_prunus_tc_m30-155988.pdf

FOTOGRAFIES

